CAMICE AD USO MEDICO

NON STERILE – MONOUSO

Istruzioni d'uso:

Rimuovere un camice dal dispenser con le mani pulite e aprirlo.
Posizionare l'asola camice al collo passando sopra la testa, quindi annodare i lacci dietro la schiena, posizionando il grembiule in modo tale che la maggior parte del lato anteriore del corpo risulti protetto meglio possibile
Una volta utilizzato, rimuovere il camice rompendo i legacci e l'asola attorno al collo; afferrare il camice dall'interno e rimuoverlo
Dopo aver rimosso il camice, pulire e decontaminare le mani

Precauzioni :

- Dispositivo medico monouso e non può essere lavato
- Quando il capo è danneggiato, sporco, oppure inumidito, sostituirlo con un nuovo camice
- Il camice utilizzato deve essere smaltito conformemente alle prescrizioni dettate dalle normative cogenti sul rispetto dell'ambiente .
- Il prodotto non deve essere incenerito
- Questo prodotto è per adulti. Non permettere l'utilizzo ai bambini sotto i 10 anni di età

Composizione :

100% polipropilene

FABBRICANTE :	**Conformità :**
FIL-CO L.T.D. *29/A Ivan Vazov str.* *4330 Sopot – Bulgaria* *Tel./fax: 03134 61 82* *www.fil-co.com* *fil-co@hotmail.com* **MADE IN BULGARY**	CE UNI EN 13795-1:2019 DISPOSITIVO MEDICO CLASSE 1

CAMICE VISITATORE
PLP MONOUSO 30

Art. F001-30

CE

UNI EN 13795 – 1 : 2019
DISPOSITIVO MEDICO
CLASSE 1

NON STERILE – MONOUSO

INDICAZIONI D'USO: Prima dell impiego verificare che il capo sia pulito e non presenti rotture, scuciture o altre alterazioni che possano comprometterne le caratteristiche. le caratteristiche indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato, in perfetto stato di conservazione maneggiare il capo dopo aver effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani

PRODOTTO DA:
FIL-CO L.T.D.
29/A Ivan Vazov str.
4330 Sopot – Bulgaria
Tel./fax: 03134 61 82
www.fil-co.com
fil-co@hotmail.com

LOTTO N.
codice a barre

Consigliato ove si necessita di una frequente sostituzione del capo, per la protezione degli operatori e dei visitatori in ambito sanitario, ideale per prevenire le contaminazioni.
Indossarlo, nei contatti stretti e prolungati. Sostituirlo quando visibilmente sporco tra una procedura e l altra sullo stesso paziente. Rimuoverlo prima di lasciare la stanza se il paziente è collocato in stanza singola o dopo la prestazione se il paziente è in isolamento funzionale.
Porre la massima attenzione finché la divisa non venga a contatto con superfici ambientali potenzialmente contaminate, per evitare di trasferire i micro organismi ad altri pazienti o all ambiente.



MADE IN BULGARY